


# Odvedenie pohybovej rovnice pre matematické kyvadlo

Matematické kyvadlo je idealizovaný mechanický oscilátor, ktorý si predstavujeme ako malé, prakticky bodové telesko s hmotnosťou  $m$ , zavesené na niti s dĺžkou  $\ell$ , ktorej hmotnosť považujeme za nulovú (obr. 3). Na telesko pôsobia dve sily – sila  $\vec{F}_\ell$ , ktorou ho pridržiaava



lanko a tiažová sila  $\vec{F}_G = m\vec{g}$ . Pohyb matematického kyvadla je opísaný rovnakou pohybovou rovnicou, ako pohyb akéhokoľvek iného kyvadla, teda ako pohyb telesa otáčajúceho sa okolo horizontálnej osi, ktorá neprechádza jeho ťažiskom:

$$\vec{M} = J\vec{\alpha} \quad (1)$$

V tomto vzťahu je  $\vec{M}$  súčet momentov síl pôsobiacich na teleso,  $J$  jeho moment zotrvačnosti vzhľadom na os otáčania a  $\vec{\alpha}$  je vektor uhlového zrýchlenia telesa. Vodorovná os otáčania prechádza bodom závesu a vzhľadom na túto os je moment sil  $\vec{F}_\ell$  nulový, lebo táto sila zvierá s polohovým vektorom  $\vec{r}$ , ktorý má dĺžku  $\ell$ , uhol  $180^\circ$ . Preto sa pri pohybe kyvadla uplatňuje iba moment  $\vec{M}$  tiažovej sily. Vychádzajúc z obrázku, na ktorom je znázornený jednotkový vektor  $\vec{\eta}$  kolmý na rovinu obrázku a smerujúci za obrázok, môžeme napísať nasledujúce vzťahy:

$$\vec{M} = \vec{r} \times m\vec{g} = -\vec{\eta} m g \ell \sin \varphi, \quad \vec{\alpha} = \vec{\eta} \frac{d^2\varphi}{dt^2} \quad (2)$$

Po ich dosadení do (1) dostaneme upravenú pohybovú rovnicu:

$$J \frac{d^2\varphi}{dt^2} \vec{\eta} = -\vec{\eta} m g \ell \sin \varphi \quad (3)$$

Pre získanie konečného tvaru uvážime, že moment zotrvačnosti hmotného bodu je  $J = m\ell^2$ .

## Riešenie pohybovej rovnice pre matematické kyvadlo

V tomto odseku okrem iného ukážeme, že perióda veľkých kmitov vyjadrená ako

$$T = T_0 \left[ 1 + \frac{1}{4} \sin^2 \left( \frac{\varphi_0}{2} \right) \right] \quad (4)$$


je menej presná ako jednoduchšie vyjadrenie

$$T = T_0 \left( 1 + \frac{1}{16} \varphi_0^2 \right) \quad (5)$$

Výpočet riešenia je ukázaný v knihe [L. D. Landau, E. M. Lifšic: *Mechanika*, Fizmatlit (Moskva, 2002)]. Tu len podrobnejšie rozoberieme výsledok, najmä rozvoj do rôznych mocnín a aj presné numerické riešenie.

Presné riešenie pre periódu matematického kyvadla je

$$T = 4\sqrt{\frac{\ell}{g}} K \left( \sin \frac{\varphi_0}{2} \right)$$



kde

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\xi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \xi}}$$

je tzv. úplný eliptický integrál prvého druhu. Dá sa rozvinúť do Maclaurinovho radu (špeciálny prípad Taylorovho radu, keď rozvíjame funkciu okolo bodu 0). Ozn.  $\sin \xi \equiv s$ . Najnižšie derivácie potom sú

$$\begin{aligned} K'(k) &= \int_0^{\pi/2} \frac{k s^2}{(1 - k^2 s^2)^{3/2}} d\xi \\ K''(k) &= \int_0^{\pi/2} \left[ \frac{s^2}{(1 - k^2 s^2)^{3/2}} + \frac{3k^2 s^4}{(1 - k^2 s^2)^{5/2}} \right] d\xi = \int_0^{\pi/2} \frac{s^2(1 + 2s^2 k^2)}{(1 - k^2 s^2)^{5/2}} d\xi \\ K^{(3)}(k) &= \int_0^{\pi/2} \left[ \frac{9k s^4}{(1 - k^2 s^2)^{5/2}} + \frac{15k^3 s^6}{(1 - k^2 s^2)^{7/2}} \right] d\xi = \int_0^{\pi/2} \frac{3k s^4(3 + 2k^2 s^2)}{(1 - k^2 s^2)^{7/2}} d\xi \\ K^{(4)}(k) &= \int_0^{\pi/2} \frac{3s^4(3 + 24k^2 s^2 + 8k^4 s^4)}{(1 - k^2 s^2)^{9/2}} d\xi \end{aligned}$$

Najnižšie derivácie pri  $k = 0$  sú

$$K(0) = \frac{1}{2}\pi, \quad K'(0) = 0, \quad K''(0) = \frac{1}{4}\pi, \quad K^{(3)}(0) = 0, \quad K^{(4)}(0) = \frac{27}{16}\pi$$

Pri tom bolo treba vypočítať o.i.

$$\int \sin^4 \xi d\xi = \frac{3}{8}\xi - \frac{1}{4}\sin 2\xi + \frac{1}{32}\sin 4\xi + \text{const.}$$

Maclaurinov rozvoj eliptického integrálu môžeme teda písať

$$K(k) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}k^2 + \frac{27\pi}{16 \cdot 4!}k^4 + \dots$$

a perióda kyvadla sa dá potom vyjadriť

$$T\left(\sin\frac{\varphi_0}{2}\right) = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}\left(1 + \frac{1}{4}\sin^2\frac{\varphi_0}{2} + \frac{9}{64}\sin^4\frac{\varphi_0}{2} + \dots\right) \quad (6)$$

Praktickejšie a pri priblížení na konečný počet členov aj výrazne presnejšie (pozri nižšie v texte a na grafe) je vyjadrenie

$$T(\varphi_0) = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}\left[1 + \frac{1}{16}\varphi_0^2 + \frac{11}{3072}\varphi_0^4 + \dots\right] \quad (7)$$

ktoré sa dá získať, keď sínusy v riešení (6) rozvineme do Maclaurinových mocninových radov. Jednotlivé priblíženia ku presnému riešeniu získavame buď z výsledku (6) alebo z výsledku (7) uvážením istého počtu členov týchto nekonečných radov. Na grafe na predošlej strane vidíme, ako presné alebo nepresné sú jednotlivé priblíženia. Pri týchto porovnaníach presností pochopiteľne vždy porovnáваме vyjadrenia s rovnakým počtom členov. Podstatné je, že *priblíženie v mocninách  $\varphi_0$  je očividne lepšie než priblíženie v mocninách  $\sin(\varphi_0/2)$* . To platí jednak keď periódu uvažujeme ako funkciu argumentu  $\varphi_0$  a aj keď ju uvažujeme ako funkciu argumentu  $\sin(\varphi_0/2)$ . Príliš malé hodnoty priblíženia pomocou mocnín sínusu sú dôsledkom oscilujúceho charakteru tejto funkcie, aj keď tá oscilácia pre rozsah  $\varphi_0$  na grafe ešte nie je osciláciou, len zmešujúcou sa strmostou.

Nakoniec si všimnime, že do napísaných riešení v tvare radov vstupujú len párne mocniny  $\varphi_0$  resp.  $\sin(\varphi_0/2)$ . To je v súhlase s úvahou, že funkcia (riešenie)  $T = T(\varphi_0)$  musí byť párnou funkciou argumentu  $\varphi_0$ . Táto vlastnosť riešenia vyplýva zo samotnej symetrie úlohy, t.j. že kyvadlo sa rozkmitá rovnako bez ohľadu na to, či je počiatočná výchylka  $\varphi_0$  naľavo alebo napravo (záporná alebo kladná).